DM n°1

Soit f définie pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$ par :

$$f(x) = \ln(x) + x$$

- (a) Étudier les variations de f .
(b) Déterminer le signe de $f(x) - x$.
- Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $u_0 > 1$ et pour tout entier n ,

$$u_{n+1} = f(u_n)$$

- (a) Montrer que pour tout entier n :

$$u_n \geq 1$$

- (b) En déduire que la suite (u_n) est croissante.
(c) Montrer que la suite (u_n) n'est pas majorée.
(d) En déduire la limite de la suite (u_n) .

- On suppose à présent que $u_0 = e$

- (a) Montrer que, pour tout entier n :

$$u_{n+1} \geq u_n + 1$$

- (b) En déduire que, pour tout entier n :

$$u_n \geq n + e$$

- (c) Retrouver la limite de la suite (u_n) .

- Soit $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $v_0 \in]0, 1[$ et pour tout entier n ,

$$v_{n+1} = f(v_n)$$

- (a) Montrer qu'il existe un entier r pour lequel

$$v_r < 0.$$

- (b) En déduire que la suite (v_n) n'est plus définie à partir du rang $r + 1$.

Exercice facultatif.

Soit f la fonction définie par l'expression

$$f(x) = \frac{e^x}{e^x - x}.$$

1. Etablir, pour tout $x \in \mathbb{R}$, l'inégalité

$$e^x \geq x + 1.$$

Préciser alors l'ensemble de définition de f .

2. Calculer les limites de f en $-\infty$ et $+\infty$.
3. Etudier les variations de f sur son ensemble de définition.
4. Pour tout entier naturel n , on pose

$$u_n = \int_0^n f(x) dx.$$

- (a) Montrer que, pour tout entier naturel n ,

$$u_n = n + \int_0^n \frac{x}{e^x - x} dx.$$

- (b) En déduire la limite de la suite (u_n) quand n tend vers $+\infty$

5. Pour tout entier naturel n , on pose maintenant

$$v_n = \int_0^n \frac{x}{e^x - x} dx.$$

On étudie dans cette question la convergence de la suite (v_n) .

- (a) Montrer que la suite (v_n) est croissante.
(b) Montrer, pour tout réel x , l'inégalité

$$e^x - x \geq \frac{e^x}{2}.$$

- (c) Déduire de l'inégalité précédente, l'inégalité pour tout entier naturel n

$$v_n \leq \int_0^n 2xe^{-x} dx.$$

- (d) On pose, pour tout réel x ,

$$h(x) = xe^{-x}.$$

Exprimer $h(x)$ en fonction de e^{-x} et $h'(x)$. Calculer alors pour tout entier naturel n

$$\int_0^n 2xe^{-x} dx,$$

- (e) Etablir alors que la suite (v_n) est majorée et conclure.