Mathématiques

Corrigé du DS n°4

Exercice 1.

A. Etude sur $]0, +\infty[$

1. Variations de f

(a) f est définie en tout x tel que $e^{2x} - 1 \neq 0$ ce que l'on résout :

$$e^{2x} - 1 \neq 0 \Leftrightarrow e^{2x} \neq 1 \Leftrightarrow 2x \neq 0 \quad \text{car exp est strictement croissante sur } \mathbb{R}.$$

Donc f est définie sur $\mathbb{R}^*$ f est un quotient bien défini de fonctions usuelles dérivables, f est dérivable sur $\mathbb{R}^*$.

(b) Pour tout $x \in \mathbb{R}^*$,

$$f'(x) = \frac{2e^{2x}(e^{2x} - 1) - 2e^{2x}(e^{2x} + 1)}{(e^{2x} - 1)^2} = \frac{2(e^{4x} - e^{2x} - e^{4x} - e^{2x})}{(e^{2x} - 1)^2} = \frac{-4e^{2x}}{(e^{2x} - 1)^2}$$

et comme un carré est toujours positif et une exponentielle strictement positive, $f' < 0$ sur $\mathbb{R}^*$

2. Limites

(a) On a :

$$f(x) = \frac{e^{2x} + 1}{e^{2x} - 1} = \frac{e^{2x} - 1 + 2}{e^{2x} - 1} = \frac{e^{2x} - 1}{e^{2x} - 1} + \frac{2}{e^{2x} - 1} = 1 + \frac{2}{e^{2x} - 1}$$

(b) Comme $e^{2x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$ on a alors

$$\frac{2}{e^{2x} - 1} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$$

ainsi

$$f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 1$$

(c) On a $e^{2x} \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} 1^+$ (car exp est continue sur $\mathbb{R}$), $e^{2x} - 1 \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} 0^+$ et $\frac{1}{e^{2x} - 1} \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} +\infty$ d'où enfin

$$f(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} +\infty$$

3. On a donc

x	0	$+\infty$
$f'(x)$		-
$f(x)$		$+\infty$
		$\searrow$
		1

f est strictement positive sur $]0, +\infty[$.

4. Primitives de f sur $]0, +\infty[$

(a) g est dérivable en tout x tel que $e^{2x} - 1 > 0$ donc sur $\mathbb{R}_+^*$ et

$$g'(x) = \frac{1}{e^{2x} - 1} e^{2x} \cdot 2 - 1 = \frac{2e^{2x} - e^{2x} + 1}{e^{2x} - 1} = f(x)$$

(b) Donc g est une primitive de f sur $]0, +\infty[$.

(c) Comme $g' = f > 0$ sur $]0, +\infty[$, g est strictement croissante sur $]0, +\infty[$. Comme exp est continue en 0, on a

$$e^{2x} \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} 1^+$$

$e^{2x} - 1 \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} 0^+$ donc

$$g(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} -\infty.$$

(d) Comme $e^{2x} - 1 = e^{2x}(1 - e^{-2x})$, on a

$$g(x) = \ln(e^{2x}(1 - e^{-2x})) - x = \ln(e^{2x}) + \ln(1 - e^{-2x}) - x$$

donc

$$g(x) = 2x - x + \ln(1 - e^{-2x}) = x + \ln(1 - e^{-2x})$$

On a $e^{-2x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$ et

$$\ln(1 - e^{-2x}) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$$

donc

$$g(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty.$$

(e) g est dérivable sur $]0, +\infty[$ et sa dérivée est strictement positive. Donc d'après le théorème de la bijection monotone, g est bijective de $]0, +\infty[$ dans $] \lim_{x \rightarrow 0} g(x), \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) [=] -\infty, +\infty[$. Or $0 \in]-\infty, +\infty[$. Donc l'équation $g(x) = 0$ a une unique solution dans $]0, +\infty[$.

B. Construction de $\mathcal{C}$, la courbe représentative de f

1. Soit $x \neq 0$, on a

$$\begin{aligned} f(x) + f(-x) &= \frac{e^{2x} + 1}{e^{2x} - 1} + \frac{e^{-2x} + 1}{e^{-2x} - 1} = \frac{(e^{2x} + 1)(e^{-2x} - 1) + (e^{-2x} + 1)(e^{2x} - 1)}{(e^{2x} - 1)(e^{-2x} - 1)} \\ &= \frac{(e^{2x} + 1)(e^{-2x} - 1) + (e^{-2x} + 1)(e^{2x} - 1)}{(e^{2x} - 1)(e^{-2x} - 1)} \\ &= \frac{e^{2x-2x} - e^{2x} + e^{-2x} - 1 + e^{-2x+2x} + -e^{-2x} + e^{2x} - 1}{(e^{2x} - 1)(e^{-2x} - 1)} \\ &= \frac{e^0 - 1 + e^0 - 1}{(e^{2x} - 1)(e^{-2x} - 1)} \\ &= 0 \end{aligned}$$

Donc $f(-x) = -f(x)$ et f est impaire. Donc sa courbe représentative est symétrique par rapport à l'origine.

2. $\mathcal{C}$ a donc pour asymptote les droites d'équation $x = 0$ en 0^+ et en 0^- par symétrie et celles d'équation $y = 1$ en $+\infty$ et $y = -1$ en $-\infty$ par symétrie.

3. On a

$$f(\ln(3)) = \frac{e^{2\ln(3)} + 1}{e^{2\ln(3)} - 1} = \frac{3^2 + 1}{3^2 - 1} = \frac{10}{8} = \frac{5}{4}$$

De plus,

$$f'(\ln(3)) = \frac{-4e^{2\ln(3)}}{(e^{2\ln(3)} - 1)^2} = \frac{-4 \cdot 3^2}{(3^2 - 1)^2} = -\frac{4 \cdot 3^2}{8^2} = -\frac{9}{16}$$

4. Pour construire $\mathcal{C}$ on place d'abord les asymptotes et la tangente en $\ln(3)$ grâce à la valeur et à la pente (coefficient directeur) de la tangente en ce point.

Exercice 2.

1. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = \frac{x}{x^2 + x + 1}$

On désigne par C sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

(a) f est dérivable en x tel que $x^2 + x + 1 \neq 0$. Or ce polynôme du second degré a pour discriminant $\Delta = 1 - 4 < 0$. Donc elle est toujours strictement négative. Donc f est définie, continue, et dérivable sur $\mathbb{R}$.

$$f'(x) = \frac{(x^2 + x + 1) - (2x + 1)x}{x^2 + x + 1} = \frac{x^2 + x + 1 - 2x^2 - x}{(x^2 + x + 1)^2} = \frac{1 - x^2}{(x^2 + x + 1)^2}$$

$$f(x) = \frac{x}{x^2 + x + 1} = \frac{x}{x^2(1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2})} = \frac{1}{x(1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2})} \quad \text{ainsi } f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0 \text{ et } f(x) \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} 0$$

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
$1 - x^2$	$-$	0	$+$	$+$	0
$f'(x)$	$-$	0	$+$	$+$	0
$f(x)$	0	$\searrow$	-1	$\nearrow$	0
				$\nearrow$	$1/3$
					$\searrow$
					0

(b) En 0, $f(0) = 0$ et $f'(0) = 1$.

Conclusion : La tangente a donc pour équation $y = x$.

(c) Les positions relatives de C et T sont données par le signe de $f(x) - x$:

$$f(x) - x = \frac{x}{x^2 + x + 1} - x = \frac{x - x(x^2 + x + 1)}{x^2 + x + 1} = \frac{-x^3 - x^2}{x^2 + x + 1} = \frac{-x^2(x+1)}{x^2 + x + 1}$$

x	$-\infty$	-1	0	$+\infty$
$-x^2$		-	-	0
$x+1$		-	0	+
$f(x) - x$		+	0	-
Position de C et T	C au dessus de T		C en dessous de T	C en dessous de T

Conclusion : C et T ont deux points d'intersection de coordonnées $(-1, -1)$ et $(0, 0)$.

(d) On trace C et T .

2. On considère la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 1, \\ u_{n+1} = f(u_n) = \frac{u_n}{u_n^2 + u_n + 1}, \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N} \end{cases}$$

(a) Soit $p \in \mathbb{N}^*$

$$f\left(\frac{1}{p}\right) = \frac{\frac{1}{p}}{\frac{1}{p^2} + \frac{1}{p} + 1} = \frac{p}{1 + p + p^2}$$

Comme $1 + p + p^2 \geq p + p^2 = p(1 + p) > 0$, on a

$$\frac{1}{1 + p + p^2} \leq \frac{1}{p(p+1)}$$

Conclusion : Ainsi pour $p > 0$, $f\left(\frac{1}{p}\right) = \frac{p}{1 + p + p^2} \leq \frac{1}{p+1}$

(b) Pour $n \in \mathbb{N}$, soit $\mathcal{P}_n$ la proposition : " $0 < u_n \leq \frac{1}{n+1}$ ".

Initialisation : $0 < u_0 = 1 \leq \frac{1}{0+1}$. Donc $\mathcal{P}_0$ est vraie.

Hérédité : On suppose $\mathcal{P}_n$ vraie pour un $n \in \mathbb{N}$ fixé. Montrons que $\mathcal{P}_{n+1}$ est vraie.

Par hypothèse de récurrence $0 < u_n \leq \frac{1}{n+1}$, comme f est strictement croissante sur $[0, 1]$ et que $0, u_n$ et $\frac{1}{n+1}$ en sont éléments,

$$f(0) < f(u_n) \leq f\left(\frac{1}{n+1}\right)$$

De plus, $f\left(\frac{1}{n+1}\right) \leq \frac{1}{n+2}$ car $n+1 \geq 1$ on a bien $0 < u_{n+1} \leq \frac{1}{n+2}$. Donc $\mathcal{P}_{n+1}$ est vraie.

Conclusion : D'après le principe de récurrence, on a : pour tout entier n , $0 < u_n \leq \frac{1}{n+1}$.

(c) Comme $\frac{1}{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$, par encadrement

$$\text{Conclusion : } \boxed{\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0}$$

3. (a) D'après les variations de f , pour $x \neq 0$, $f(x) \neq 0$. Et

$$\frac{1}{f(x)} = \frac{x^2 + x + 1}{x} = x + 1 + \frac{1}{x}$$

Donc comme pour tout entier n , $u_n \neq 0$

$$\text{Conclusion : } \boxed{\frac{1}{u_{n+1}} = \frac{1}{f(u_n)} = u_n + 1 + \frac{1}{u_n}}$$

(b) Pour $n \in \mathbb{N}^*$, soit $\mathcal{P}_n$ la proposition : " $\frac{1}{u_n} \leq n + 1 + \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$ ".

Initialisation : $\frac{1}{u_1} = u_0 + 1 + \frac{1}{u_0} = 1 + 1 + \sum_{k=1}^1 \frac{1}{k}$. Donc $\mathcal{P}_1$ est vraie.

Hérédité : On suppose $\mathcal{P}_n$ vraie pour un $n \in \mathbb{N}^*$ fixé. Montrons que $\mathcal{P}_{n+1}$ est vraie. On a

$$\frac{1}{u_{n+1}} = u_n + 1 + \frac{1}{u_n}$$

or d'après 2.b) $u_n \leq \frac{1}{n+1}$ et par hypothèse de récurrence $\frac{1}{u_n} \leq n + 1 + \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$, donc

$$\frac{1}{u_{n+1}} \leq \frac{1}{n+1} + 1 + n + 1 + \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = n + 2 + \sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{k}$$

Donc $\mathcal{P}_{n+1}$ est vraie.

$$\text{Conclusion : } \boxed{\text{D'après le principe de récurrence, on a : pour tout entier } n \geq 1, \frac{1}{u_n} \leq n + 1 + \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}.}$$

4. (a) On calcule la différence pour tout réel $x \geq 2$

$$g(x) = \frac{1}{x} - \ln(x) + \ln(x-1)$$

g est dérivable sur $[2, +\infty[$ et

$$g'(x) = -\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x} + \frac{1}{x-1} = \frac{-x+1-x(x-1)+x^2}{x^2(x+1)} = \frac{1}{x^2(x+1)} > 0$$

donc g est strictement croissante sur $[2, +\infty[$ et comme

$$g(x) = \frac{1}{x} - \ln(x) + \ln(x-1) = \frac{1}{x} - \ln\left(\frac{x}{x-1}\right) = \frac{1}{x} + \ln\left(1 - \frac{1}{x}\right) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$$

$$\text{Conclusion : } \boxed{\text{Pour } x \geq 2, g(x) = \frac{1}{x} - \ln(x) + \ln(x-1) < 0.}$$

(b) On fait alors la somme de ces inégalités pour k de 2 à n :

$$\begin{aligned} \sum_{k=2}^n \frac{1}{k} &\leq \sum_{k=2}^n \ln(k) - \ln(k-1) = \sum_{k=2}^n \ln(k) - \sum_{k=2}^n \ln(k-1) = \sum_{k=2}^n \ln(k) - \sum_{k=1}^{n-1} \ln(k) \\ &\leq \ln(n) - \ln(1) = \ln(n) \end{aligned}$$

On reporte dans l'inégalité sur $1/u_n$

$$\frac{1}{u_n} \leq n + 1 + \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = n + 1 + \frac{1}{1} + \sum_{k=2}^n \frac{1}{k} \leq n + 2 + \ln(n)$$

$$\text{Conclusion : } \boxed{\text{Pour } n \geq 2, \frac{1}{u_n} \leq n + 2 + \ln(n).}$$

(c) On a donc pour $n \geq 2$

$$u_n \geq \frac{1}{n+2+\ln(n)} \quad \text{ainsi} \quad nu_n \geq \frac{n}{n+2+\ln(n)}$$

d'où l'encadrement :

$$\frac{n}{n+2+\ln(n)} \leq nu_n \leq \frac{n}{n+1} \quad \text{car d'après 2.b) } 0 < u_n < \frac{1}{n+1}$$

$$\frac{1}{1+\frac{2}{n}+\frac{\ln(n)}{n}} \leq nu_n \leq \frac{1}{1+\frac{1}{n}}$$

Or $\lim_{n \rightarrow +\infty} 1 + \frac{2}{n} + \frac{\ln(n)}{n} = 1$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} 1 + \frac{1}{n} = 1$, par encadrement,

Conclusion : $\boxed{\lim_{n \rightarrow +\infty} nu_n = 1.}$

5. On peut proposer le programme suivant

```
n=int(input("entrez la valeur de n :"))
u=1
for k in range(1,n+1):
    u=u/(u^2+u+1)
print("la valeur de un est",u)
```