DM n°7

Soit $a \in]0, 1[$, on définit A la matrice suivante

$$A = \begin{pmatrix} a & 1-a \\ 1-a & a \end{pmatrix}$$

Dans cet exercice, on cherche à résoudre dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ l'équation suivante d'inconnue Z

$$Z^2 = A \quad (1)$$

1. Dans cette question, on suppose que $a = \frac{5}{8}$ et donc

$$A = \begin{pmatrix} 5/8 & 3/8 \\ 3/8 & 5/8 \end{pmatrix}$$

- (a) Soit $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$. Calculer P^2 puis P^4 .
- (b) Montrer que P est inversible et trouver sa matrice inverse.
- (c) Déterminer la matrice $D = P^{-1}AP$.

2. On se place désormais dans le cas général où $a \in]0, 1[$, ainsi

$$A = \begin{pmatrix} a & 1-a \\ 1-a & a \end{pmatrix}.$$

Déterminer la matrice $D_a = P^{-1}AP$ où P est la matrice précédente.

3. On définit $Y = P^{-1}ZP$.

(a) Montrer que l'équation (1) équivaut à

$$Y^2 = D_a \quad (2)$$

(b) On cherche à résoudre l'équation (2) en prenant Y sous la forme générale : $Y = \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix}$

- i. Ecrire le système de quatre équations à quatre inconnues x, y, z et t qui est équivalent à l'équation (2)
- ii. Montrer qu'aucune solution de (2) ne vérifie $x + t = 0$.
- iii. Pour $a \in]0, 1[$, résoudre ce système et donner toutes les solutions de l'équation (2) suivant la valeur de a .

- (c) En déduire le nombre de solutions de l'équation (1) suivant la valeur de a .
- (d) Donner les quatre solutions de l'équation (1) dans le cas où $a = 5/8$.

Exercice facultatif.

On considère les matrices carrées d'ordre trois :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Partie I : Réduction de A

1. Déterminer si A est inversible.
2. Montrer que P est inversible et déterminer P^{-1} .
3. Montrer que $A = PDP^{-1}$.

Partie II : Résolution de l'équation $M^2 = A$

On se propose de résoudre l'équation suivante d'inconnue $M \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$

$$(*) \quad M^2 = A.$$

Soit $M \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$, on note $N = P^{-1}M P$. (La matrice P^{-1} a été définie en **I.2.**)

1. Montrer l'équivalence suivante

$$M^2 = A \iff N^2 = D.$$

2. Montrer que, si $N^2 = D$, alors $N D = D N$.
3. En déduire que, si $N^2 = D$, alors N est diagonale.
4. Déterminer toutes les matrices diagonales N telles que $N^2 = D$.
5. En déduire la solution B de l'équation $(*)$ tel que $P^{-1}BP$ soit une matrice diagonale avec des coefficients diagonaux positifs ou nuls.

Partie III : Intervention d'un polynôme

1. Montrer qu'il existe un polynôme Q de degré deux, et un seul, que l'on calculera, tel que :

$$Q(0) = 0, \quad Q(1) = 1, \quad Q(4) = 2.$$

2. En déduire :

$$-\frac{1}{6}A^2 + \frac{7}{6}A = B. \quad (\text{La matrice } B \text{ a été définie en } \mathbf{II.5.})$$

3. Montrer que pour tout $F \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$, on a

$$A F = F A \iff B F = F B.$$